

DYNEXAN MUNDGEL®

Schmerzstillendes Gel zur Anwendung im Mund

kreussler
PHARMA

Seit vielen Jahren hat sich **DYNEXAN MUNDGEL®** bei der Behandlung von Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen bewährt.

- schnelle und gezielte Wirkung
- Nebenwirkungsinzidenz unter 0,01 %
- frei von Alkohol, Zucker, Gluten und Laktose
- für Säuglinge, Kinder und Erwachsene
- rezeptfreies Arzneimittel – nur in Apotheken erhältlich
- erstattungsfähig bis zum 12. Lebensjahr



DYNEXAN MUNDGEL®. Zus.: 1 g Gel enth.: Wirkstoff: Lidocainhydrochlorid 1H₂O 20 mg; weilt. Bestandt.: Benzalkoniumchlorid, Bitterfenichelöl, Glycerol, Guargalactomannan, Minzöl, dickfl. Paraffin, Pfefferminzöl, Saccharin-Natrium, hochdisp. Siliciumdioxid, Stearinsäure, Thymol, Titandioxid, weißes Vaseline, ger. Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur zeitw., symptom. Behandl. von Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen. **Gegenanzeigen:** absolut: Überempfindl. gegenüber den Inhaltsst. von DYNEXAN MUNDGEL® od. gegen and. Lokalanästhetika vom Säureamid-Typ. relativ: Pat. mit schw. Störungen des Reizbildungs- u. Reizleitungssystems am Herzen, akuter dekompensierter Herzinsuffizienz u. schweren Nieren- od. Lebererkrankungen. **Nebenwirkungen:** Sehr selten (< 0,01 % einschl. Einzelfälle): lokale allerg. u. nichtallerg. Reakt. (z.B. Brennen, Schwellungen, Rötungen, Jucken, Urtikaria, Kontaktdermatitis, Exantheme, Schmerzen), Geschmacksveränd., Gefühllosigkeit, anaphylakt. Reakt. u. Schockreakt. mit begleitender Symptomatik. Stand: Juli 2012. Chem. Fabrik Kreussler & Co. GmbH, D-65203 Wiesbaden

Mittel zur Schmerzlinderung bei Aphthen, Lippenherpes und anderen schmerzhaften Zuständen von Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen

	DYNEXAN MUNDGEL®	Kamistad® Gel	InfectoGingi® Mundgel	Pyralvex® Lösung	BloXaphte® Spray / Gel für Erwachsene, Junior Gel, Mundspülung
Indikation	<ul style="list-style-type: none"> Zur zeitweiligen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen 	<ul style="list-style-type: none"> Zur Behandlung von leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut 	<ul style="list-style-type: none"> Zur zeitweiligen unterstützenden Behandlung von Entzündungen und Wunden der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches 	<ul style="list-style-type: none"> Zur temporären Behandlung schmerzhafter, entzündlicher Zustände der Mundschleimhaut, insbesondere Aphthen Zur temporären, unterstützenden, symptomatischen Behandlung der Gingivitis 	<ul style="list-style-type: none"> Aphthen, Stomatitis aphthosa, Wiederkehrende Schleimhautläsionen der Mundhöhle (rezidivierende Geschwüre und Knötchenflechte)
Altersgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Ab 0 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> Ab 12 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> Ab 0 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> Ab 12 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> Nur Erwachsene (Spray, Gel) Ab 30 Monaten (Junior Gel, Mundspülung)
Wirkstoffe	<ul style="list-style-type: none"> Lidocain 20 mg/g Gel (Monopräparat) 	<ul style="list-style-type: none"> Lidocain 20mg/g Gel Auszug aus Kamillenblüten 	<ul style="list-style-type: none"> Lidocain 10 mg/g Gel Auszug aus Kamillenblüten und Salbeiblättern 	<ul style="list-style-type: none"> Salicylsäure Trockenextrakt aus Rhabarberwurzeln 	<ul style="list-style-type: none"> Hyaluronsäure Enthält keinen lokal schmerzlindernden Wirkstoff Barrierewirkung schützt vor äußeren Reizen
Alkohol	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Zulassungsstatus	<ul style="list-style-type: none"> Regulär zugelassenes Arzneimittel nach vollumfänglicher behördlicher Prüfung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und pharmazeutischen Qualität apothekenpflichtig 	<ul style="list-style-type: none"> Traditionelle Zulassung ohne behördliche Prüfung der Wirksamkeit wie bei einer regulären Zulassung apothekenpflichtig 	<ul style="list-style-type: none"> Regulär zugelassenes Arzneimittel nach vollumfänglicher behördlicher Prüfung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und pharmazeutischen Qualität apothekenpflichtig 	<ul style="list-style-type: none"> Regulär zugelassenes Arzneimittel nach vollumfänglicher behördlicher Prüfung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und pharmazeutischen Qualität apothekenpflichtig 	<ul style="list-style-type: none"> Medizinprodukt
Zu beachten	---	---	<ul style="list-style-type: none"> Vergleichsweise geringe Konzentration des schmerzlindernden Lidocains 	<ul style="list-style-type: none"> Häufig: vorübergehende Verfärbung von Zähnen und Mundschleimhaut möglich Nach Applikation Mund mind. 15 min nicht spülen. Direkt nach Applikation nichts essen oder trinken. 	<ul style="list-style-type: none"> Nach Applikation mindestens 30 min nichts essen oder trinken.