

# DYNEXAN MUNDGEL®

Schmerzstillendes Gel zur Anwendung im Mund

**kreussler**  
PHARMA

- schnelle und gezielte Wirkung
- Nebenwirkungsinzidenz unter 0,01 %
- frei von Alkohol, Zucker, Gluten und Laktose
- für Säuglinge, Kinder und Erwachsene
- rezeptfreies Arzneimittel – nur in Apotheken erhältlich
- erstattungsfähig bis zum 12. Lebensjahr



**DYNEXAN MUNDGEL®. Zus.:** 1 g Gel enth.: Wirkstoff: Lidocainhydrochlorid 1H<sub>2</sub>O 20 mg; weil. Bestandt.: Benzalkoniumchlorid, Bitterfenchelöl, Glycerol, Guargalactomannan, Minzöl, dickfl. Paraffin, Pfefferminzöl, Saccharin-Natrium, hochdisp. Siliciumdioxid, Sternanisöl, Thymol, Titandioxid, weißes Vaseline, ger. Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur zeitw., symptom. Behandl. von Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen. **Gegenanzeigen:** absolut: Überempfindl. gegenüber den Inhaltsst. von DYNEXAN MUNDGEL® od. gegen and. Lokalanästhetika vom Säureamid-Typ. relativ: Pat. mit schw. Störungen des Reizbildungs- u. Reizleitungssystems am Herzen, akuter dekompensierter Herzinsuffizienz u. schweren Nieren- od. Lebererkrankungen. **Nebenwirkungen:** Sehr selten (< 0,01 % einschl. Einzelfälle): lokale allerg. u. nichtallerg. Reakt. (z.B. Brennen, Schwellungen, Rötungen, Jucken, Urtikaria, Kontaktdermatitis, Exantheme, Schmerzen), Geschmacksveränd., Gefühllosigkeit, anaphylakt. Reakt. u. Schockreakt. mit begleitender Symptomatik. Stand: Juli 2012. Chem. Fabrik Kreussler & Co. GmbH, D-65203 Wiesbaden

Mittel zur Schmerzlinderung bei Zahnungsbeschwerden von Säuglingen/Kleinkindern, aber auch von Jugendlichen/Erwachsenen (z. B. bei Durchbruch der Weisheitszähne)

	<b>DYNEXAN MUNDGEL®</b>	<b>Kamistad® Gel</b>	<b>Kamistad® Baby</b>	<b>InfectoGingi® Mundgel</b>	<b>Dentinox®-Gel N Zahnungshilfe</b>	<b>Osanit® Zahnungskügelchen</b>
<b>Indikation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur zeitweiligen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Behandlung von leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Massage des Zahnfleisches bei zahnenden Kindern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur zeitweiligen unterstützenden Behandlung von Entzündungen und Wunden der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur kurzzeitigen Linderung der Beschwerden bei der ersten Zahnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahnungsbeschwerden bei Säuglingen und Kleinkindern</li> </ul>
<b>Altersgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 0 Jahren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 12 Jahren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 0 Jahren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 0 Jahren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 0 Jahren</li> <li>nicht für Erwachsene und Schulkinder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 0 Jahren</li> <li>nicht für Erwachsene und Schulkinder</li> </ul>
<b>Wirkstoffe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lidocain 20 mg/g Gel (Monopräparat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lidocain 20 mg/g Gel</li> <li>Auszug aus Kamillenblüten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polidocanol</li> <li>Auszug aus Kamillenblüten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lidocain 10 mg/g Gel</li> <li>Auszug aus Kamillenblüten und Salbeiblättern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lidocain 3,4 mg/g Gel</li> <li>Macrogollaurylether 3,2 mg/g</li> <li>Tinktur aus Kamillenblüten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 homöopathische Bestandteile</li> <li><b>Kein</b> lokal schmerzlindernder Wirkstoff</li> </ul>
<b>Alkohol</b>	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
<b>Zulassungsstatus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulär zugelassenes Arzneimittel nach vollumfänglicher behördlicher Prüfung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und pharmazeutischen Qualität</li> <li>apothekenpflichtig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traditionelle Zulassung <b>ohne</b> behördliche Prüfung der Wirksamkeit wie bei einer regulären Zulassung</li> <li>apothekenpflichtig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kosmetikum</li> <li>apothekenexklusiv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulär zugelassenes Arzneimittel nach vollumfänglicher behördlicher Prüfung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und pharmazeutischen Qualität</li> <li>apothekenpflichtig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traditionelle Zulassung <b>ohne</b> behördliche Prüfung der Wirksamkeit wie bei einer regulären Zulassung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Homöopathikum</li> <li>apothekenpflichtig</li> </ul>
<b>Zu beachten</b>	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zusätzliches Risiko für Allergien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Angaben zum Wirkstoffgehalt</li> <li>Zusätzliches Risiko für Allergien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergleichsweise geringe Konzentration des schmerzlindernden Lidocains</li> <li>Zusätzliches Risiko für Allergien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergleichsweise geringe Konzentration des schmerzlindernden Lidocains und Macrogollaurylethers</li> <li>Zusätzliches Risiko für Allergien</li> <li>Fruktosequelle durch Sorbitol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwändige Applikation. Mehrmals täglich 8 Streukügelchen</li> <li>Frühzeitige Gewöhnung des Kindes an einen süßen Geschmack durch Xylit</li> </ul>