



# Stoppt den Schmerz.

Schnell wirkendes Arzneimittel zur Schmerzlinderung von Zahnungsbeschwerden bei Säuglingen/Kleinkindern sowie von Druckschmerzen durch Zahnspannen und bei Durchbruch der Weisheitszähne



Frei von Alkohol, Zucker, Gluten und Laktose



Für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder zugelassen



Erstattungsfähig bis zum 12. Lebensjahr

## Mittel zur Schmerzlinderung im Mund in der Übersicht

	DYNEXAN MUNDGEL®	Kamistad® Gel	Kamistad® Baby Gel	InfectoGingi® Mundgel	Dentinox®-Gel N Zahnungshilfe	Osanit® Zahnungskügelchen
<b>Indikation(en)</b>	Symptomatische Behandlung von Schmerzen an Mundschleimhaut und Zahnfleisch	Behandlung von leichten Entzündungen an Mundschleimhaut und Zahnfleisch	Massage des Zahnfleisches bei zahnenden Kindern	Unterstützende Behandlung von Entzündungen und Wunden der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches	Kurzzeitige Linderung der Beschwerden bei der ersten Zahnung	Zahnungsbeschwerden bei Säuglingen und Kleinkindern
<b>Wirkstoff(e)</b>	+ Lidocain 20 mg/g Gel	+ Lidocain 20 mg/g Gel - Kamillenblüten-Auszug	● Polidocanol - Kamillenblüten-Auszug	+ Lidocain 10 mg/g Gel - Kamillenblüten- und Salbeiblätter-Auszug	+ Lidocain 3,4 mg/g Gel ● Polidocanol - Kamillenblüten-Tinktur	- Nur homöopathische Bestandteile, u. a. Kamille
<b>Alkohol</b>	+ Nein	- Ja	+ Nein	+ Nein	- Ja	+ Nein
<b>Zulassungsstatus</b>	+ Regulär zugelassenes Arzneimittel	● Traditionelle Zulassung ohne behördliche Prüfung	- Kosmetikum	+ Regulär zugelassenes Arzneimittel	● Traditionelle Zulassung ohne behördliche Prüfung	- Homöopathikum ohne klinische Prüfung
<b>Cave für Allergiker</b>	+ Laktose- und glutenfrei	- Kamillenblüten-Auszug - Zimtöl	- Kamillenblüten-Auszug	- Kamillenblüten-Auszug	- Kamillenblüten-Tinktur	- Kamille
<b>Hinweise</b>	+ Monopräparat	- Ab 12 Jahren	- Keine Angaben zum Wirkstoffgehalt	● Vergleichsweise geringe Konzentration des schmerzlindernden Lidocains	● Vergleichsweise sehr geringe Konzentration des schmerzlindernden Lidocains - Fructosequelle durch Sorbitol	- Kein schmerzlindernder Wirkstoff - Frühzeitige Gewöhnung des Kindes an einen süßen Geschmack
<b>Erstattungsfähigkeit</b>	+ Bis zum 12. Lebensjahr	- Nicht erstattungsfähig	- Nicht erstattungsfähig	+ Bis zum 12. Lebensjahr	- Nicht erstattungsfähig	- Nicht erstattungsfähig
<b>Studien</b>	+ Wirksamkeit durch klinische Studien bestätigt + Wirksamkeit bei Säuglingen ab 0 Jahren durch klinische Studien bestätigt	- Keine klinischen Studien zur Wirksamkeit veröffentlicht	- Keine klinischen Studien zur Wirksamkeit veröffentlicht	- Keine klinischen Studien zur Wirksamkeit veröffentlicht	- Keine klinischen Studien zur Wirksamkeit veröffentlicht	- Keine klinischen Studien zur Wirksamkeit veröffentlicht

**DYNEXAN MUNDGEL®.** Zusammensetzung: 1 g Gel enthält: Wirkstoff: Lidocainhydrochlorid 1 H<sub>2</sub>O 20 mg; weitere Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Bitterfenchelöl, Glycerol, Guargalaktomannan, Minzöl, dickflüssiges Paraffin, Pfefferminzöl, Saccharin-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, Sternanisöl, Thymol, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: zur zeitweiligen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen. Gegenanzeigen: absolut: Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen von DYNEXAN MUNDGEL® oder gegen andere Lokalanästhetika vom Säureamid-Typ. Relativ: Patienten mit schweren Störungen des Reizbildungs- und Reizleitungssystems am Herzen, akuter dekompensierter Herzinsuffizienz und schweren Nieren- oder Lebererkrankungen. Nebenwirkungen: sehr selten (< 0,01% einschließlich Einzelfälle): lokale allergische und nichtallergische Reaktionen (z. B. Brennen, Schwellungen, Rötungen, Jucken, Urtikaria, Kontaktdermatitis, Exantheme, Schmerzen), Geschmacksveränderungen, Gefühlslosigkeit, anaphylaktische Reaktionen und Schockreaktionen mit begleitender Symptomatik. Stand: März 2021. Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, D-65203 Wiesbaden.